

APÊNDICE 1
CRITÉRIOS CASPAR PARA DIAGNÓSTICO DE ARTRITE PSORÍACA (40)

Nome: _____

Data: ___/___/___

Doença inflamatória articular (artrite periférica, axial ou nas enteses) e pontuação igual ou superior a 3 nas seguintes categorias*

1. Psoríase^{**}: atual (2 pontos), histórico de psoríase (1 ponto) ou antecedente familiar (1 ponto)
2. Distrofia ungueal^{***}: (1 ponto)
3. Fator reumatoide negativo: (1 ponto)
4. Dactilite^{****}: atual (1 ponto) ou histórico de dactilite: (1 ponto)
- 5 Radiografia (mãos e pés) com evidência radiológica de proliferação óssea^{*****}: (1 ponto)

*Para confirmação de diagnóstico de AP segundo os critérios CASPAR, é necessário haver uma doença inflamatória articular e pelo menos pontuação igual ou superior a 3 nos demais categorias.

**Psoríase atual é definida como a psoríase cutânea ou de couro cabeludo presente, avaliada por reumatologista ou dermatologista. Histórico de psoríase é definido como a história da doença relatada por paciente, clínico geral, dermatologista, reumatologista ou outro profissional de saúde qualificado. Antecedente familiar é definido como a história de psoríase em familiar de primeiro ou segundo grau segundo relato do paciente.

***Distrofia ungueal, incluindo onicólise, pitting e hiperkeratose, observada em avaliação clínica.

****Dactilite atual definida como aumento de digital difuso ou história de dactilite descrita por reumatologista.

*****Evidência radiográfica de neoformação óssea justa-articular (excluindo formação osteofitária) nas radiografias de mãos e pés.

Traduzido e adaptado de Taylor e colaboradores (40).